

Geometria 3
A.A. 2018 – 2019
Esercizi

Irriducibilità di polinomi di più variabili. Risultante. Discriminante.

– Sia K un campo. Si dimostri che un polinomio $f(x) \in K[x]$ di grado d , dove $2 \leq d \leq 3$, è riducibile se e solo se $f(x)$ possiede almeno uno zero in K .

– Sia $f(x) \in \mathbb{C}[x]$ un polinomio di grado dispari. Si dimostri che $F(x, y) = y^2 - f(x)$ è irriducibile in $\mathbb{C}[x, y]$. È vera la stessa affermazione se $f(x)$ è di grado pari?

– Si dimostri che il polinomio $f(x, y) = xy^3 - (x + 1)^4$ è irriducibile in $\mathbb{C}[x, y]$.

– Si dimostri che il polinomio $f(x, y) = x^3 + y^3 + xy$ è irriducibile in $\mathbb{C}[x, y]$.

– Sia k un campo. Siano $a(x), b(x)$ e $c(x)$ tre polinomi di $k[x]$. Si dimostri che $f(x, y) = a(x)y^2 + b(x)y + c(x) \in k[x, y]$ è irriducibile se e solo se $a(x), b(x)$ e $c(x)$ non hanno fattori non costanti in comune e il discriminante $\Delta(x) = b(x)^2 - 4a(x)c(x)$ non sia un quadrato in $k[x]$.

– Si dimostri che il polinomio $y^4 + x^3 + x^2 - 2x$ è irriducibile in $\mathbb{C}[x, y]$.

– Stabilire se il polinomio $x^4 + x^2y + (x + 1)y^2$ è irriducibile o meno in $\mathbb{C}[x, y]$.

- Si dimostri che l'operazione di omogeneizzazione $f(x, y) \mapsto F(x_0, x_1, x_2) = x_0^{gr(f)} f\left(\frac{x_1}{x_0}, \frac{x_2}{x_0}\right)$ stabilisce una corrispondenza biunivoca tra i polinomi irriducibili $f(x, y)$ e i polinomi omogenei irriducibili $F(x_0, x_1, x_2)$ non divisibili per x_0 .
- Si dimostri che il polinomio $x_0x_1^4 + x_1x_2^4 + x_0^4x_2$ è irriducibile in $\mathbb{C}[x_0, x_1, x_2]$.
- Si dimostri che il polinomio $x_0x_1^3 + x_0x_1^2x_2 + x_2^4$ è irriducibile in $\mathbb{C}[x_0, x_1, x_2]$.
- Sia $d \geq 1$. Siano $f_{d-1}(x, y)$ e $f_d(x, y)$ due polinomi omogenei di gradi $d - 1$ e d rispettivamente, che sono primi tra di loro. Si dimostri che il polinomio $f(x, y) = f_{d-1}(x, y) + f_d(x, y)$ è irriducibile.
- Sia $d \geq 2$. Siano $f_{d-2}(x, y)$, $f_{d-1}(x, y)$ e $f_d(x, y)$ tre polinomi omogenei dove $gr(f_i) = i$. Trovare un criterio necesario e sufficiente affinché il polinomio $f(x, y) = f_{d-2}(x, y) + f_{d-1}(x, y) + f_d(x, y)$ sia irriducibile.
- Si dimostri che il risultante dei polinomi $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$ e $g(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2$ è uguale a

$$R(f, g) = \begin{vmatrix} a_0 & a_2 \\ b_0 & b_2 \end{vmatrix}^2 - \begin{vmatrix} a_0 & a_1 \\ b_0 & b_1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$$

- Risolvere il sistema

$$\begin{aligned} f(x, y) &= y^2 - 7xy + 4x^2 + 13x - 2y - 3 = 0 \\ g(x, y) &= y^2 - 14xy + 9x^2 + 28x - 4y - 5 = 0 \end{aligned}$$

– Escludere x dal sistema

$$\begin{aligned}x^2 - xy + y^2 &= 0 \\x^2y + xy^2 &= 6\end{aligned}$$

– Si verifichino le seguenti formule:

$$\text{se } f(x) = Ax^2 + Bx + C, \quad \text{allora } \Delta(f) = B^2 - 4AC$$

$$\text{se } f(x) = x^3 + px + q, \quad \text{allora } \Delta(f) = -(4p^3 + 27q^2)$$

– Trovare i valori di λ per i quali i seguenti polinomi hanno radici multiple

(a) $x^3 - 3x + \lambda$

(b) $x^3 + 3x^2 + (3 - 3\lambda)x - 3\lambda + 3$

(c) $x^4 - 4x + \lambda$

Studio locale delle curve algebriche piane.

– Sia C la curva affine di equazione $y^2 = f(x)$, dove $gr(f) \geq 3$. Si dimostri che C è non singolare se e solo se il discriminante $\Delta(f) \neq 0$.

– Si dimostri che la curva di Fermat $C \subset \mathbb{P}^2$ di equazione $x_0^n + x_1^n + x_2^n = 0$ è non singolare.

– Sia C la curva affine di equazione $y^2 = f(x)$, dove $gr(f) \geq 4$. Si dimostri che la sua chiusura proiettiva C^* possiede un unico punto improprio e che questo punto è singolare.

– Si dimostri che se una curva affine o proiettiva è riducibile, $C = C_1 + C_2$, allora ogni punto P dell'intersezione dei supporti di C_1 e C_2 è singolare.

– Si dimostri che se una curva piana proiettiva è non singolare essa è irriducibile. È vera la stessa affermazione per le curve affini?

– Trovare le rette tangenti principali alla curva di equazione $y^2 = x^2(x - 1)$ nel punto $(0, 0)$.

– Trovare eventuali asintoti delle coniche $y^2 = 2px$ e $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

– Una curva si dice ridotta se tutte le sue componenti irriducibili hanno molteplicità 1. Si dimostri che se il campo base k è algebricamente chiuso, allora ogni curva piana ridotta, affine o proiettiva, possiede finiti punti singolari.

– Nel piano affine \mathbb{A}^2 si considerino le curve di equazioni:

a. $y^2(x - 2y) - (x^2 + y^2) = 0$

b. $(x - y)^3 + x^2 - y^2 - 4x = 0$

c. $x^2(x^2 - y^2) - 4x^2y + y^3 = 0$

d. $x^2y^2 - x^3 - y^3 - xy = 0$

e. $y^2 + x^4 + x^5 = 0$

f. $y - 4x^2 - x^5 = 0$

Di ognuna di esse studiare le proprietà locali nell'origine e all'infinito.

– Si consideri la curva C di equazione

$$f(x, y) = x^3 + xy^2 + x^2 + 2y^2 - x - 1 = 0.$$

Si dimostri che C è irriducibile. Trovare e classificare i punti singolari di C . Studiare le proprietà locali di C all'infinito.

– Studiare i punti singolari e trovare gli asintoti della curva di equazione $(x + 1)(y - x)^3 = 1$.

Curve nel piano e nello spazio.

^{-1*}La lunghezza, da $t = 0$ a $t = 9$, dell'arco di curva di equazioni parametriche: $x = 3t$ e $y = 2t^2$ è:

A) $\int_0^{81} \sqrt{9 - 16t^2} dt$

B) $\int_0^9 \sqrt{9 + 16t^2} dt$

C) $\int_0^9 \sqrt{9t^2 - 4t^4} dt$

D) $\int_0^9 \sqrt{9t^2 + 4t^4} dt$

– *La lunghezza, da $t = 0$ a $t = 2$, dell'arco di curva di equazioni parametriche: $x = \frac{1}{2}t^2$, $y = \frac{1}{9}(6t + 9)^{\frac{3}{2}}$ è uguale a:

A) 12

B) 14

C) 8

D) 10

– *La lunghezza dell'arco di catenaria $y = \cosh x$ da $x = 0$ a $x = \ln 2$ è

A) $1/4$

B) $2/3$

C) $3/4$

D) 1

– *Una particella si muove lungo il percorso descritto dalla curva di equazioni parametriche: $x = \cos^3 t$, $y = \sin^3 t$. La distanza percorsa per t compreso tra 0 e $\pi/2$ è uguale a:

¹Gli esercizi segnalati con * sono stati proposti alle prove di ammissione al TFA a.a.2011/2012.

- A) 0,75
- B) 0
- C) 1,50
- D) -3,50

– Sia $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva avente curvatura costante $\kappa \neq 0$. Dimostrare che il sostegno $\alpha(I)$ è contenuto in una circonferenza di raggio $\frac{1}{|\kappa|}$.

– Sia $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva regolare avente curvatura non nulla in ogni punto. Supponiamo che la sua immagine sia contenuta in una sfera di raggio r . Dimostrare che $\kappa(t) \geq \frac{1}{r}$ per ogni $t \in I$.

– Sia $\beta : J \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva differenziabile a velocità unitaria. Ponendo $\beta_1(s) = \beta(-s)$ si consideri la curva $\beta_1 : -J \rightarrow \mathbb{R}^3$. Si dimostri la seguente relazione tra gli apparati di Frenet delle curve β e β_1 :

$$\begin{aligned} (T_1(s), N_1(s), B_1(s), \kappa_1(s), \tau_1(s)) &= \\ (-T(-s), N(-s), -B(-s), \kappa(-s), \tau(-s)). \end{aligned}$$

– Calcolare la curvatura della catenaria $y = a \cosh(\frac{x}{a})$, $a > 0$.

– Per ciascuna delle seguenti due curve parametrizzate rispondere se il loro supporto è contenuto in una retta o no. Motivare la risposta.

- a) $\alpha(t) = (t^2 - t, 3t^2 - 3t - 2, 2t^2 - 2t + 1)$
- b) $\beta(t) = (t^2 - 1, 3t^2 - 5, 2t^2 - t)$

– Determinare il raggio del cerchio osculatore della curva $\alpha(t) = (2t, \frac{1}{t}, -2t)$ in $(2, 1, -2)$.

– Determinare il raggio del cerchio osculatore della curva $\alpha(t) = (t^3, t^2, t)$ nel punto in cui $t = 1$.

– Calcolare l'apparato di Frenet della seguente curva in un punto generico:

$$\alpha(t) = (2t, t^2, \frac{1}{3}t^3), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Di che curva si tratta?

– Calcolare l'apparato di Frenet, l'equazione del piano osculatore, il raggio e il centro del cerchio osculatore della seguente curva nel punto indicato:

$$\alpha(t) = (\cos(t)^2, \cos(t), \sin(t)) \quad \text{nel punto in cui } t = 0.$$

– Calcolare l'apparato di Frenet, l'equazione del piano osculatore, il raggio e il centro del cerchio osculatore della seguente curva nel punto indicato:

$$\alpha(t) = (t, te^t, t^2e^t) \quad \text{nel punto in cui } t = 0.$$

– Calcolare l'apparato di Frenet, l'equazione del piano osculatore, il raggio e il centro del cerchio osculatore della seguente curva nel punto indicato:

$$\alpha(t) = \left(\frac{t^2}{2}, \frac{t^3}{3}, \ln(t)\right) \quad \text{nel punto in cui } t = 1.$$

– Calcolare l'apparato di Frenet della seguente curva in un punto generico:

$$\alpha(t) = \left(t, \frac{t^2}{2}, \frac{t^3}{3}\right).$$

– Calcolare l'apparato di Frenet della seguente curva in un punto generico:

$$\alpha(t) = t(\cos t, \sin t, 1).$$

– Determinare la curvatura e l'evolvente dell'ellisse $x = 2 \cos t$, $y = \sin t$.

– Determinare i valori massimo e minimo della curvatura dell'ellisse

$$x = a \cos t, \quad y = b \sin t \quad \text{dove} \quad a > b > 0.$$

– Data la curva nello spazio $\alpha(t) = (at - t^3, 3t^2, 3t + t^3)$:

(a) stabilire per quale valore di $a \in \mathbb{R}$ la curva è piana. Assegnato ad a tale valore, trovare l'equazione del piano che contiene la curva;

(b) posto $a = 3$, determinare la curvatura, la torsione e il triedro di Frenet in un generico punto di α ;

– Data la curva nello spazio $\alpha(t) = (3t^2, 1 + 3t, at^3)$:

(a) stabilire per quale valore di $a \in \mathbb{R}$ la curva α è rispettivamente: i) piana, ii) un'elica generalizzata.

(b) trovati i valori di a per i quali la curva è piana, per ciascun tale valore trovare l'equazione del piano corrispondente che contiene la curva;

(c) posto $a = 2$, determinare la curvatura, la torsione e il triedro di Frenet in un generico punto di α .

(d) Calcolare la lunghezza dell'arco di curva compreso tra i punti $A(0, 1, 0)$ e $B(3, -2, -2)$.

– Data la curva nello spazio $\alpha(t) = (\cos t, \sin t, \cos at)$ stabilire per quali valori di a la curva è piana. Quali curve si trovano in questo caso?

- Data la curva nello spazio $\alpha(t) = (e^{at}, e^{-t}, \sqrt{2}t)$
 - (a) stabilire per quali valori di $a \in \mathbb{R}$ la curva è piana.
 - (b) Posto $a = 1$ determinare la curvatura e la torsione di α in un punto generico. Di che curva si tratta?

Geometria differenziale delle superfici.

- Sia M l'elicoide $\varphi(u, v) = (u \cos v, u \sin v, bv)$, $u > 0, v \in \mathbb{R}$.
 - (a) Calcolare la prima forma fondamentale di M .
 - (b) Calcolare l'area della porzione dell'elicoide $1 < u < 3$, $0 \leq v \leq 2\pi$.
- Dimostrare che l'area della porzione della sfera compresa tra due paralleli dipende solo dalla distanza tra i piani che contengono i paralleli.
- Sia $x = a \cosh(\frac{z}{a})$ la curva catenaria nel piano Oxz , $a > 0$. Sia M la superficie di rotazione attorno all'asse delle z .
 - (a) Trovare una parametrizzazione regolare di M . Disegnare la superficie.
 - (b) Calcolare la prima forma fondamentale di M ;
 - (c) Calcolare l'area della porzione del catenoide compresa tra i piani $z = 1$ e $z = -1$.

Suggerimento. Utilizzare l'identità $\cosh^2(u) = \frac{1}{2}(1 + \cosh 2u)$.

- *Nello spazio \mathbb{R}^3 sia S la superficie sferica di centro O e di raggio 1. Le rette nella geometria sferica sono per definizione le circonferenze di raggio massimo (quindi, le intersezioni di S con i piani che passano per O). Sia ABC un triangolo sferico non degenerare su S . Se α, β, γ denotano gli angoli rispettivamente in A, B e C allora (indicare la risposta corretta tra (A),(B),(C) e (D)):

(A) $\alpha + \beta + \gamma = \pi$

(B) $\alpha + \beta + \gamma$ non è un multiplo di π , ma è una costante indipendente della scelta del triangolo ABC

(C) $\alpha + \beta + \gamma$ è uguale all'area del triangolo ABC

(D) $\alpha + \beta + \gamma$ è sempre maggiore di π

– Sia $D = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 3\}$ e $\varphi : D \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}^3$, l'applicazione così definita:

$$\varphi(u, v) = (u, v, \sqrt{u^2 + v^2}).$$

Dimostrare che φ è una parametrizzazione regolare e in $\varphi(1, 1)$ calcolare curvatura media, curvatura gaussiana, curvatures principali e piano tangente affine.

– Sia S la superficie descritta dalla parametrizzazione

$$\varphi(u, v) = (uv^2, v^3, u^2v), \quad (u, v) \in (0, \infty) \times (0, \infty).$$

(a) Mostrare che φ è una parametrizzazione regolare.

(b) Classificare i punti di M .

(c) Determinare l'angolo delle linee coordinate di S per il punto $Q = \varphi(1, 1)$.

(d) Determinare le direzioni asintotiche e le direzioni principali nel punto Q .

– Sia $U = \{(s, t) \in \mathbb{R}^2 \mid -\frac{\pi}{2} < s, t < \frac{\pi}{2}\}$ e

$$\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \varphi(s, t) = (\sin(t), \cos(t) \cos(s), \sin(s)).$$

Dimostrare che φ è una parametrizzazione regolare e calcolare in $\varphi(0, 0)$ curvatura media, curvatura gaussiana, curvatures principali e piano tangente affine.

– Sia M la superficie descritta dalla parametrizzazione

$$\varphi(u, v) = (\cos u - v \sin u, \sin u + v \cos u, v), \quad (u, v) \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \times \mathbb{R}.$$

(a) Dimostrare che φ è una parametrizzazione regolare. Di che superficie si tratta?

(b) Trovare le curvatures Gaussiana e media in un punto qualsiasi di M .

(c) Determinare le curvatures principali e le direzioni principali di curvatura nel punto $P_0 = \varphi(0, 0)$.

(d) Se α_H e la sezione normale determinata dal punto $P_0 = \varphi(0, 0)$ e dal versore $\mathbf{e} = \frac{1}{2}(-\mathbf{j} + \sqrt{3}\mathbf{k})$ calcolare la curvatura di α_H nel punto P_0 .

– Sia M la superficie descritta dalla parametrizzazione

$$\varphi(u, v) = (u, e^u \cos v, e^u \sin v) \quad (u, v) \in (-\infty, +\infty) \times (0, 2\pi).$$

(a) Dimostrare che φ è una parametrizzazione regolare. Di che superficie si tratta?

(b) Calcolare la curvatura Gaussiana e media in un punto qualsiasi di M .

(c) Determinare le curvatures principali e le direzioni principali di curvatura nel punto $P_0 = \varphi(0, 0)$.

(d) Se α_H e la sezione normale determinata dal punto $P_0 = \varphi(0, 0)$ e dal versore $\mathbf{e} = \frac{\sqrt{3}}{3}(\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k})$ calcolare la curvatura di α_H nel punto P_0 .

– Sia M la superficie descritta dalla parametrizzazione locale

$$\varphi(u, v) = \left(u, \frac{v^2}{2}, \frac{u^2}{2} - \frac{v^3}{3}\right) \quad (u, v) \in D.$$

(a) Dopo aver determinato D in modo tale che la superficie sia regolare, calcolare le curvatures Gaussiana e media in un generico punto di M . Classificare i punti di M .

(b) Se α_H e la sezione normale determinata dal punto $P_0 = \varphi(1, 1)$ e dal versore $\frac{\sqrt{2}}{2}(\mathbf{i} + \mathbf{j})$ calcolare la curvatura di α_H nel punto P_0 .